

Dechra
Veterinary Products

Algoritmo de diagnóstico del hipotiroidismo canino

Reseña, historia y signos clínicos sugestivos de hipotiroidismo

Analítica general para descartar enfermedad no tiroidea (ENT) → Sospecha de ENT → Continuar investigación y tratamiento

Pruebas de primera línea para el hipotiroidismo
T4, cTSH

- T4 baja, cTSH normal → Enfermedad no tiroidea; Fármacos; 25% de perros hipotiroideos → Realizar pruebas adicionales
- T4 baja, cTSH aumentada → **Hipotiroidismo**
- T4 normal, cTSH normal → Eutiroidismo
- T4 normal, cTSH aumentada → Hipotiroidismo compensado; Retirada reciente de medicación supresora de tiroides; Recuperación de una ENT; Interferencia con anticuerpos anti-T4 → Repetir pruebas tras una retirada más larga del fármaco o tras la recuperación de la ENT

Realizar pruebas adicionales → **Pruebas de segunda línea**
T4 libre, TgAA

- T4 libre normal, TgAA - negativo → Hipotiroidismo poco probable
- T4 libre normal, TgAA - positivo → **Tiroiditis linfocítica con hipotiroidismo temprano compensado**
- T4 libre reducida, TgAA - negativo → **Hipotiroidismo o ENT grave**
- T4 libre reducida, TgAA - positivo → **Tiroiditis linfocítica con hipotiroidismo**

Considerar pruebas de función tiroidea dinámicas o gammagrafía si se requiere confirmación de hipotiroidismo o eutiroidismo

Reproduced with permission from the BSAVA Manual of Canine and Feline Endocrinology, 4th edition. © BSAVA

Canitroid®
MEJORES TIEMPOS POR VENIR